

Klamydiabehandling med Doxycyklin t ex Doxyferm 100 mg

Du har en infektion som är orsakad av klamydiabakterier

- Ta en tablett på morgonen och en tablett på kvällen i 7 dagar.
- Om tablettarna tas i samband med måltid minskar risken för illamående, kräkningar och diarré vilket är de vanligaste biverkningarna. Du bör undvika att ta tablettarna tillsammans med mjölkprodukter, då det kan minska effekten. • Svälj tablettens med minst ett halvt glas vatten. Om du har svårt att svälja tablettens kan du lösa upp den i lite vatten.
- Det är viktigt att du tar alla tablettarna för att du ska bli av med infektionen.
- Undvik helst läkemedel mot sur mage, halsbränna samt tablettens med järn eller zink under behandlingstiden. Doxycyklin fungerar sämre tillsammans med dessa läkemedel.
- För att du inte ska smitta någon annan bör du avstå från samlag/annan intim kontakt under de första 10 dagarna från det att du påbörjar behandlingen. Detta gäller även om din partner har klamydia och får behandling samtidigt.
- Vid p-pilleranvändning är det viktigt att komplettera med kondom en vecka efter avslutad behandling. Doxycyklin kan minska effekten av dina p-piller.
- Undvik att sola under behandlingen samt cirka 5 dagar efter. Doxycyklin ökar känsligheten i huden och solexponering kan ge hudproblem i form av rodnad, klåda och utslag.
- Avstå även alkohol under behandling då upptaget av medicineringen försämras.
- Du behöver inte ta något nytt prov för att kontrollera att infektionen har försvunnit. Om du ändå skulle vilja ta ett nytt prov är det viktigt att det har gått 4 veckor efter att du avslutade behandlingen.

Du är alltid välkommen att ringa om du undrar över något eller kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se
Tfn:

Lite fakta om Klamydia

Klamydia smittar vid olika typer av sex. Många har klamydia utan att veta om det och då kan man smitta sin sexpartner. Därför är det bra att ta en klamydiatest när det kan finnas risk för smitta.

Provtagning bör göras tidigast 10 dagar efter det samlag där man tror sig ha blivit smittad. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor leda till äggledarinflammation och hos män till bitestikelinflammation. Detta kan hos en del leda till ofrivillig barnlöshet.

Klamydiainfektion lyder under smittskyddslagen. Det innebär att den som är smittad ska låta behandla sig och även tala om med vem eller vilka hen haft samlag med det sista halvåret, ibland längre. Dessa personer får sedan ett brev/ telefonsamtal där de blir kallade till provtagning. De har ingen möjlighet att få reda på vem som uppgivit deras namn.

När du berättar vem eller vilka du haft sex med bidrar du till minskad smittspridning av klamydia!